Fonctions définie par une intégrale

Exercice 1. Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$\int_0^1 \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt.$$

1. Montrer que F est de classe C^2 . Calculer $F(0)$ et $F'(0)$.
2. Montrer que F est strictement décroissante et convexe.
3. Montrer que l'on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

4. Montrer qu'il existe une seule fonction continue $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $g(x) = \frac{1-e^{-x}}{x}$ pour tout $x \neq 0$.

On considère l'équation différentielle

$$y + y'' = g(x). \tag{1}$$

5. Montrer que F est solution de l'équation différentielle (1).
6. Montrer que F est la seule solution de (1) ayant une limite finie quand $x \rightarrow +\infty$.
7. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$F(x) = \frac{\pi}{4} \cos(x) - \frac{\ln(2)}{2} \sin(x) + \int_0^x g(t) \sin(x-t) dt.$$

Exercice 2. Soit $F : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(x^2 \cos^2 t + \sin^2 t) dt.$$

1. Montrer que la fonction F est de la classe C^2 .
2. Calculer $F'(x)$ pour tout $x > 0$, $x \neq 1$.
3. Calculer $F(1)$. En déduire une expression explicite de $F(x)$ pour tout $x > 0$.

Exercice 3. La fonction Gamma

1. Montrer que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt$ converge si et seulement si $s > 0$.

On définit la fonction Gamma Γ par

$$\Gamma : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \Gamma(s) := \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt.$$

2. Montrer que pour tout $s > 0$ on a $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. En déduire que $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour tout entier $n \geq 1$.

3. Montrer que la fonction Γ est de classe C^2 et convexe. En déduire que Γ atteint son minimum en un point de l'intervalle $(1, 2)$.
4. Montrer que l'on a $\lim_{x \rightarrow 0} x\Gamma(x) = 1$.
5. Dessiner l'allure du graphe de Γ .

Exercice 4. Soit $F : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt$.

1. Montrer que F est continue.
2. Montrer que F est de classe C^2 sur $[0, +\infty)$ et que F est solution de l'équation différentielle $y + y'' = 1/x$.
3. Montrer que $F(x)$ tend vers 0 lorsque $x \rightarrow +\infty$.
4. Montrer que $F(x)$ est la seule solution de l'équation différentielle $y + y'' = 1/x$ ayant une limite finie lorsque $x \rightarrow +\infty$.
5. Montrer que pour tout $x > 0$ les intégrales généralisées $\int_x^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt$ et $\int_x^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t} dt$ sont convergentes.
6. Montrer que pour tout $x > 0$ on a $F(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t+x} dt$.
7. En déduire $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Exercice 5. Déterminer l'abscisse de convergence de la transformée de Laplace des fonctions suivantes :

$$f_1(t) = e^{2t} \cos(wt) \quad (w \in \mathbb{R}), \quad f_2(t) = t^n e^{-3t}, \quad f_3(t) = \cosh(wt) \quad (w > 0).$$

Exercice 6. Déterminer la transformée de Laplace pour les fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \cosh(x), & f_2(x) &= 3x^2, \\ f_3(x) &= xe^{-x}, & f_4(x) &= 3 + x^3, \\ f_5(x) &= xe^{4x}, & f_6(x) &= \cos^3(x)e^6, \\ f_7(x) &= H(x-1) - H(x-2), & f_8(x) &= (x-2)^2 H(x-2), \\ f_9(x) &= \sum_{n=0}^{+\infty} (H(x-2n) - H(x-(2n+1))), & f_{10}(x) &= (e^x - e^{2x} \cos(\frac{2}{3}x)). \end{aligned}$$

Exercice 7. Déterminer la transformée de Laplace inverse des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} F_1(s) &= \frac{1}{(s+3)(s+2)}, & F_2(s) &= \frac{1}{s^2(s^2+9)}, \\ F_3(s) &= \frac{2s+6}{s^2+4}, & F_4(s) &= \frac{3s}{(s-1)(s^2-4)}. \end{aligned}$$

Exercice 8. On considère la fonction f dont le graphe est donné par

1. Déterminer l'expression de f sur les intervalles $[0, 1]$, $[1, 2]$ et $[2, +\infty]$.
2. Montrer que $f(x) = th(x) - 2(x-1)H(x-1) + (x-2)H(x-2)$.
3. En déduire la transformée de Laplace de f .

Exercice 9. Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes en utilisant la transformée de Laplace :

1. $\frac{dx}{dt} + 3x = 3H(t)$ avec $x(0) = 2$,
2. $\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 3x = 3t$ avec $x(0) = 0$, $x'(0) = 1$,
3. $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + x = 4\cos(2t)$ avec $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$,
4. $\frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{dx}{dt} + x = 4\delta(t)$ avec $x(0) = 0$, $x'(0) = 2$.

Exercice 10. Trouver une solution pour le système des équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= y - x, \\ \frac{dy}{dt} &= y + 3x,\end{aligned}$$

avec $x(0) = 0$ et $y(0) = 1$.

Exercice 11. Calculer la transformée de Fourier pour la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1+x & \text{si } -1 \leq x \leq 0, \\ 1-x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- Exercice 12.**
1. Calculer la transformée de Fourier de la fonction $f_a(x) = e^{-a|x|}$, $a > 0$.
 2. En utilisant la formule de l'inverse en déduire la transformée de Fourier de la fonction $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
 3. Calculer $f \star f$ et la transformée de Fourier de la fonction $g^2(x)$.
 4. Calculer la transformée de Fourier de la fonction $h(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$.

Exercice 13. Le but de cette exercice est de calculer

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} e^{itx} dt.$$

1. Donner une équation différentielle qui est vérifiée par la fonction $f(x)$.
2. En déduire $f(x)$.

Exercice 14. Soient $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Montrer que fg et $f \star g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Exercice 15. (Principe d'incertitude d'Heisenberg)

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} f^2(x) dx = 1$.

1. Montrer que

$$2 \int_{-\infty}^{+\infty} x f'(x) f(x) dx = -1.$$

2. En déduire que

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |\hat{f}(t)|^2 dt \right)^{1/2} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 |f(x)|^2 dx \right)^{1/2} \geq \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

3. Quand est-ce que l'on a égalité ?